

NÁTTÚRUVÍSINDI




Eyðfinn Magnussen
Biologur,
Fróðskaparsetur Føroya
e-mail: eyðfinnm@setur.fo

Tað hevur skótan sannað. Hon er eitt av fleiri fiskasløgum, sum er nógv minkað av tí ógvusliga fiskiskapinum, sum fer fram um okkara leiðir. Í einum hart fiskaðum havøki, er tað livihátturin hjá fiskasløgnum, sum avgerð hvørji sløg koma at valda. Tey smáu fiskasløgini, vilja við tíðini yvirtaka plássið, meðan tey stóru og seintvaksandi sløgini so líðandi minka

Menn ganga kvikliga á dekkinum. Summir rópa, meðan aðrir veitra við ormunum. Ketur verða skekllaðar fastar og onkur endi verður loystur úr. Veirurin rennur aftur úr skipinum. Tey eru við at skjóta trolíð. Løtu seinri hvorva trolkúlurnar frá vatnskorpunum. Trolíð er komið niður á botnin, og fer nú gapanði fram eftir botninum. Lemmarnir spila tað sundur, samstundis sum teir fara skúrandi eftir botninum; grópanði sand, móru og smásteinar eftir sær. Frammanfyri trolíð sæst væl av fiski. Tey ræðast trolíð, og svimja tí undan, men við tíðini lúgvast teir og fara sendandi aftur í móti trolinum. Fyrst teir smærru, síðani teir stóru. Hýsurnar royna at flýggja upp eftir, meðan toskurin sær stórrí móguleika við at fara niður móti botninum. Men sama ger. Her er einki at gera. Við sínum gapanði meskum, tekur trolnetið ímóti teimum, og beinir teir aftur í trolposan. Teir allar smæstu fiskarnir eru tó so hepnir, at teir kunnu snúgvá sær út gjøgnum trolmeskarnar, og undrandi svimja teir nú aftur í Guds friu náttúru. Hesaferð kláraðu teir tað. Øðrvísi er tó við teimum stórru fiskinum. Teir enda allir afturi í trolposanum. Har verða teir stúgvadir saman við hinum botnfiskinum, sum vóru so óhepnir, at svimja júst har, sum trolíð kom. Eftir tveimum tímum, verður trolíð drigið upp, og menninir á dekkinum taka spentir í móti við


Bert ein lítill partur av heimsins fiskasløgum verða gagnnýtt
Vit kenna í dag umleið 26.000 ymisk fiskasløg, men bert ein lítill brokpartur av teimum verða fiskaði, og hava sostatt nakran figgarligan týðning fyri samlaðu veiðuna av fiski. Tjúgu av hesum 26.000 fiskasløgnum standa fyri heilum 40 % av samlaðu heimsveiðuni. Ansjósurnar við Peru eru tær týðningarmestu.



Við sínum stóru ræðum og fyrkantaða skapi, er skótan ein lættur fongur hjá trolinum, longu frá tí hon kemur úr eggjum

Heili 7,7 milliónir tons verða árliga veiddi av hesum fiskasløgnum. Við Føroyar finnast okkurt um 180 ymisk fiskasløg. Hetta talið er óivað væl hægri, enn flestu fólk geva sær far um, tí flestu teirra hoyra vit lítið um í okkara gerandisdegi. Tað er ikki fyrr enn livfrøðingarnir fara at tosa um havið, ella tá vit siggja náttúrufrøðingarnir, at vit verða gjørd varug við alt hetta náttúrufrøðingadóm, ið dagliga svimur rundan um okkum. Men eisini á okkara leiðum er tað bert partur av øllum hesum fiskasløgum, sum koma til lands og fer gjøgnum maskinurnar á flakavirkjunum. Árliga botnfiskaveiðan við Føroyar liggur um 100.000 tons. 80 % av hesi veiðuni kemur frá 10 fiskasløgum, har toskur, upsi og hýsa eru tey týðningarmiklastu.

Náttúran - eitt fantastiskt fjølbroytni
Hóast tað bert er ein lítill partur av heimsins fiskasløgum, sum verða fiskaði við peningaligum vinningi fyri eygað, hava tey kortini týðning fyri vistiskapinina í havinum. Hvorvur okkurt teirra, viðførir hetta broytingar í vistiskapinini og plássið verður yvirtikið av onkrum øðrum. Soleiðis er náttúran. Einki pláss fær loyvi at standa óbrúkt. Hetta



Kongafiskur kann gerast 30-40 ára gamal

hefur við tíðini givið eitt fantastiskt fjølbroytni. Tey ymisku djóra- og plantusløgini hava, hvørt í sínum lagi, tilpassað seg, so mest kann fáast burtur úr tí tilfeingi, tey liva í. Summi sløg eru stór, meðan onnur eru lítill. Summi vaxa skjótt, onnur vaxa seint. Nøkur gerast gomul, meðan onnur bert liva í stutta tíð. Hetta er eisini galdandi fyri fisk. Brugda kann vera upp til 10 metrar long meðan tey minstu sløgini bert eru nakra centimetrar til longdar.

Búrfiskur gerst 100 ára gamal og kongafiskur kann gerast 30-40 ár, fær hann loyvi til tað, men hetta er eftir hondini sjáldsamt, av tí at so nógv verður fiskað av honum. Í hinum endanum er mathøguslökkurinn, hann verður bara 1 1/2 til 2 ára gamal. Tá hann hevur gjótt, doyrt hann. Eyðkenni fyri tey smáu fiskasløgini er, at tey vanligu vaxa skjótt og verða tíðliga fullvaksin og byrja at gýta. Tey stóru sløgini vaxa harafturímóti ofta spakuligt og eru fleiri ára gomul, áðrenn tey gýta fyrstu ferð. Júst hetta, at livimátin er so ymiskur, hevur týðning fyri hvussu følsom tey eru yvirfyri fiskiskapi.

Livimátin er avgerandi

Fiskasløgini, sum hava ein seina seinan livimátan eru viðkvæm-


ast, tá nógv verður fiskað í einum øki. Hetta eru fiskasløg sum vaxa seint og eru gomul áðrenn tey gýta fyrstu ferð. Hetta er staðfest í kanningum, sum enskir livfrøðingar hava gjørt av fiskinum í Norðsjónum. Teir kannaðu hvussu gongdin hevði verið í stovninum hjá 23 ymiskum fiskasløgum í Norðsjónum árinum 1925 til 1996. Um tað í miðal var vorðið meira ella minni til av teimum ymiskum fiskasløgini í áðurnevnda tíðarskeiði. Við at samanbera 2 og 2 fiskasløg sum líktust í útsjónd og høvdu líknandi livshátt, funnu livfrøðingarnir, at tey fiskasløgini, sum minni var vorði til av, næstan altíð vóru stórrí enn tey sløgini, sum vóru vaksni í nøgd. Somuleiðis vísti kanningin, at fiskasløgini, sum vóru fyri minking, eisini vaksu spakuligari, og vóru bæði longri og eldri áðrenn tey gýtu fyrstu ferð. Soleiðis var minni til av reyðsprøku, meðan skrubban var vaksni í tali. Glýsufiskurin var minkaður, men meira var til hvitingsbróðir. Hávurin var eisini minkaður, meðan skilmáðurin, reyðhávurin var øktur í nøgd. Tilíkar broytingar vilja við tíðini ávirka alla fiskavistiskapinina.

Tað er ikki longur ein fyrimunur at vera stórrur. Tvørtur ímóti. Minni tú ert, stórrí er móguleikin fyri at yvirleva. Hetta vil við tíðini viðførur, at meira verður til av teimum smærru fiskasløgnum. Og tað var júst hetta sum teir ensku livfrøðingarnir staðfestu. Tá hugt varð samlað at øllum fiskasløgnum í Norðsjónum,

NÁTTÚRUVÍSINDI

Big is beautiful

– men ikki altíð tað besta



Tað eru eftir hondini ikki nógv øki á havbotninum kring Føroyar sum fáa frið fyri okkara fiskiskipum. Á myndini er vist hvar skipini veiddu undir Føroyum í 1997. Grønu prikkarnir eru lemmatrolarar, svørtu prikkarnir Cubatrolarinnir, bláu eru teir stóru linubátarnir og garnabátarnir eru brúnir (reyðu litirnir er endapositionin á torvunum og setunum hjá teimum ymiskum skipunum). Umframt hetta, koma útróðrabátarnir, sum royna við línu og snellu. Hesir dekkja tað mesta av økinum innanfyri 12 fjórðingar markið

(Mynd Fiskirannsóknarstovan)



Tann litla stóðin og skjóti vøxturin gera, at hvitingsbróðurin klárar seg væl í mun til nógv onnur fiskasløg

vísti tað seg, at miðallongdin á fullvaksna fiskinum var broytt frá at vera einar 55 cm í 1925 til at verða einar 40 til 45 cm í 1996. Eisini miðal vakstraratan var hækkað hesi árin, tí at tey smærru fiskasløgini verða skjótari fullvaksin og hav sostatt ein hægri lutfalsligan vøxtur enn tey stóru fiskasløgini. Kanningin vísti eisini, at miðallongdin á tí gýtandi fiskinum var vorðin minni, samstundis sum at gýtingaraldurinn hjá fiskasløgnum í Norðsjónum var lækkaður. Tíðan verri eru tilíkar kanningar ikki gjørdar fyri føroyska havøkidi. Vit kunnu tí ikki við vissu siga, hvussu stat er á okkara leiðum, men gongdin hevur óivað verið hin sama, men tó helst ikki so grefflig sum fyri Norðsjógvinn, tí tað eru helst fá havøki í heiminum, sum verða so trároynd sum Norðsjógvurin.

talan um fiskasløg við lágum noringsevnum, kann vandi verða á ferð. Skóta er eitt av hesum fiskasløgnum. Tað er eingin beinleiðis fiskiskapur eftir skótu, men hon sløiðist í millum veiðuna av øðrum botnfiskasløgum.

Skótan hevur útsjóndina í móti sær

Fyri flestu fiskasløg eru tað bert tann stóri fiskurin, sum verða fiskaðir. Men hetta er ikki galdandi fyri skótun. Tær hava útsjóndina ímóti sær. Tá skótan kemur úr eggjum, er hon longu 9-25 cm til longdar, og við sínum stóru ræðum og fyrkantaða skapi, verða flestu teirra tiknar av trolinum, longu frá tí tær eru foddar. Nógvar teirra fáa tí ongantið móguleikan sjálvar at gýta, tí tær verða ikki gýtingarfórar fyrr enn tær eru 8-11 ára gamlar og eru tá 40-180 cm til longdar.

Skóta - eitt viðkvæmt fiskasløg

Vanliga kann fiskiskapur ikki útrudda eitt fiskasløg, hvørki úr einum havøki, ella fáa tað at hvorva heilt. Hetta kemst av, at tá ið stovnurin minskar, gongur hetta eisini út yvir fiskiskapin. Minni verður at fáa, og er fiskastovnurin komin so langt niður, at tað ikki loysir seg at fiska, velja skipini aðrar leiðir, ella onnur fiskasløg at royna eftir. Stovnurin fær nú frið, og kann koma fyri seg aftur. Øðrvísi er við teimum fiskasløgum, sum verða fingin sum hjáveiða. Her verður veiðitrýstið ikki minkað, hóast stovnurin er í minking. Er Hetta er serliga følsamt fyri

skótu og naglaskótu, tí hesar verða ikki kynsbúnar fyrr enn tær eru ávikavist 180 og 72 cm. Hjá hesum báðum sløgnum eru so at siga allur tann gýtandi fiskurin horvin. Hetta kemur fram í einari í vísindaliga grein í tíðarritinum ICES Journal of Marine Science, har skotsku fiskifrøðingarnir P.Walker og J.Hislop greiða frá stóðini. Tá skótunarfaturat bert gýta millum 40 og 140 egg um árið, er veruligur vandi á ferð. Til samanberingar kann sigast, at toskur gýtir 2 til 10 milliónir rogn um árið og longu 5 til 20 milliónir rogn. At summi skótusløg minka, hevur tindaskótan notið gott av. Kappingin frá skótu og naglaskótu er vorðin minni, bæði um føði og pláss, og hon kann nú veruliga folda seg út. Alt hetta hevur skapt eina

broyting í skótusamfelagnum í Norðsjónum. Vanliga skótan er so at siga horvin, meðan tindaskótan hevur yvirtikið plássið. Eisini er ein "nýggj" skóta komin. Blettaskóta, sum fyrr ikki var at fáa í Norðsjógvinn, var fyrstu ferð at finna í landingarhagtolunum í 1991.

Stóðan undir Føroyum

Hvussu skótan hevur tað undir Føroyum, er enn ikki so væl kannað. Men hon sær eisini út til at vera í minking. Í 1995 vórðu fiskaði 200 tons av skótu undir

Føroyum. Í ár 2000 var veiðan minkað til 113 tons. Á hvørjum ári ger Magnus Heinason tveir skótan hevur yvirtikið plássið. Eisini er ein "nýggj" skóta komin. Blettaskóta, sum fyrr ikki var at fáa í Norðsjógvinn, var fyrstu ferð at finna í landingarhagtolunum í 1991. Hetta kemur fram í einari í vísindaliga grein í tíðarritinum ICES Journal of Marine Science, har skotsku fiskifrøðingarnir P.Walker og J.Hislop greiða frá stóðini. Tá skótunarfaturat bert gýta millum 40 og 140 egg um árið, er veruligur vandi á ferð. Til samanberingar kann sigast, at toskur gýtir 2 til 10 milliónir rogn um árið og longu 5 til 20 milliónir rogn. At summi skótusløg minka, hevur tindaskótan notið gott av. Kappingin frá skótu og naglaskótu er vorðin minni, bæði um føði og pláss, og hon kann nú veruliga folda seg út. Alt hetta hevur skapt eina

Fiskasløg	Longd sum fullvaksin	Kynsbúning		Noringsev (egg pr)	Veiðitrýst	
		Longd (cm)	Aldur (ár)		Haldba	Verand
Skóta	237	180	11	40	0.3%	*
Naglaskót	113			6	0.5%	0.60
Blettaskóta	75	58	8	25-60	0.5%	0.72
Diqlaskóta	70	59	8	90	0.5%	0.69
Tindaskóta	60	40	5	38	0.8%	0.79

Eginleikar hjá 5 skótusløgum í Norðsjónum. Við kunnleika um kynsbúning og noringsevni hjá teimum ymiskum skótusløgnum er ásett eitt langtíðar haldbart veiðitrýst fyri tey einstøku skótusløgini. Við hesum veiðitrýsti hvørki økjast ella minka skótunarfaturat uppá longri sikt. Uttast høgumegin er vist verandi veiðitrýst, sum í flestu fornum er væl hægri enn stovnurin tolr. Fyri vanligu skótuna er ikki móguligt at meta um veiðutrýsti, av tí at hon longu er so illa fyri.